TAJEMSTVÍ KVALITNÍ VÝŽIVY KOČKY



Jan Peterka

KOČIČÍ BIBLE

KAPITOLA 1

Moje kočka se má na suchém krmivu dobře

Když se objeví první vnější příznaky nějaké nemoci, můžeme začít říkat, že naše kočka má vážné potíže. Předtím je většina živých tvorů jinak považována za zcela zdravé. Takové tvrzení může znít velmi samozřejmě, ale po pečlivém zvážení byla každá kočka užívající léky na kočičí cukrovku "v pořádku" až do chvíle, kdy její majitelé začali pozorovat její příznaky.

Každá kočka, u které se zjistilo, že má ucpané močové cesty, byla považována za "zdravou", dokud majitel nepoznal potíže s močením, smrt způsobenou prasklým močovým měchýřem nebo dokud nemusela být odvezena k veterináři na urgentní katetrizaci.

Stejně tak většina koček, u nichž byl zjištěn zánět močového měchýře, byla považována za "zdravé", dokud se u nich nezačaly projevovat příznaky krve v moči, bolesti a vynechávání záchodové mísy. Většina koček byla považována za "zdravé", dokud se u nich nezačaly projevovat příznaky nesnášenlivosti potravy, když se chytily hypoalergenních složek a nevhodného krmení.
A konečně, až do okamžiku, kdy se ledvinový kámen nebo kámen v močovém měchýři zvětšil natolik, že vyvolal klinické příznaky, byla každá kočka i v tomto případě považována za "zdravou". Pacienti s rakovinou byli také považováni za zdravé, dokud se jejich nádor nerozšířil nebo nezvětšil natolik, že se u pacienta projevily klinické příznaky.

Důležitým bodem a faktorem, který si z toho všeho musíme vzít, je, že nemoci vznikají dlouho předtím, než si jich všimne jakákoli živá bytost.
Proto věřím v preventivní výživu, a ne jen v tvrzení, že "moje kočka je v pořádku na suchém krmivu". Většinou nakonec litujeme, že jsme své kočky nekrmili specifickou a vhodnou výživou, abychom se vyhnuli určitým onemocněním, která se projevují příznaky a symptomy v určitém časovém období.

Mezi důležité body, které je třeba vzít v úvahu, patří následující:

- Příliš mnoho sacharidů může být pro kočky nebezpečné
- Porozumění vazbám mezi hladinou cukru v krvi a rovnováhou tekutin

- Pro zdravý močový trakt je zapotřebí přiměřené množství vody.
- Kočky mají od přírody nízkou žízeň a potřebují vodu k jídlu.
- Kočky mají geneticky danou potřebu získávat bílkoviny z masa, nikoli z rostlin.

KAPITOLA 2

Kočky potřebují bílkoviny živočišného původu

Na rozdíl od psů jsou kočky obligátní neboli striktní masožravci, což znamená, že nemohou ve svém jídelníčku nahradit maso.

Obligátní masožravci
To znamená, že vaše kočka byla matkou přírodou stvořena k tomu, aby konzumovala značné množství živočišných bílkovin, tedy masa nebo orgánů, ale nehledala výživu v rostlinných bílkovinách, jako jsou obiloviny a zelenina. Kočky mají nedostatek určitých metabolických nebo enzymatických drah, a proto nemohou využívat rostlinné bílkoviny. Proto mohou přijímat pouze živočišné bílkoviny.

Důležité je uvědomit si, že ne všechny bílkoviny jsou stejné. Bílkoviny získané z živočišných tkání jsou velmi bohaté na aminokyseliny. Tyto kyseliny jsou hlavními stavebními kameny bílkovin a lze je považovat pouze za malý dílek větší skládačky. Rostlinné bílkoviny však tyto složky, které vyžadují obligátní masožravci postrádají, a proto neobsahují plný komplement.

Lidé a psi jsou schopni získat chybějící části skládačky z rostlin a vytvořit si vlastní stavební kameny nebo aminokyseliny, ale kočky to nedokážou. Studie a výzkumy ukázaly, že díky tomu jsou psi schopni žít na vegetariánské stravě, ačkoli vegetariánská strava se psům nedoporučuje.

Taurin - jedna z esenciálních aminokyselin, která se nenachází v rostlinných bílkovinách, ale je obsažena v mase. Nedostatek taurinu u koček vede k srdečním problémům a slepotě. Proto je třeba mít na paměti, že bílkoviny obsažené v suchém krmivu, které jsou z velké části rostlinného původu, se nevyrovná bílkovinám z masa obsaženým v konzervách.

Proto mají bílkoviny v suchém krmivu nižší biologickou hodnotu.
Společnosti vyrábějící krmiva pro domácí zvířata maximalizují své zisky a výnosy, když používají doplňky stravy, jako je kukuřice, pšenice, sója a mnoho dalších. Je to proto, že rostlinné bílkoviny jsou ve srovnání s masnými bílkovinami snadno dostupné.

Zástupci firem vyrábějících krmiva pro domácí zvířata a odborníci na veterinární výživu tvrdí, že pokud jde o živiny, jejich formy a množství, mají dostatek odborných znalostí, aby věděli, co přesně v rostlině chybí. Dále dodávají a tvrdí, že tyto chybějící prvky potravy přidávají do své stravy tak, aby byla vyvážená a kompletní, pro konzumaci obligátního masožravce.

Lidé však nejsou příliš chytří, pokud jde o výživu kočky, a v minulosti se dopouštěli fatálních chyb, když se snažili odhadnout, jak kompenzovat tak rychlou odchylku od přírody. V osmdesátých letech minulého století se zjistilo, že kočky kvůli naší neznalosti umírají na srdeční komplikace a také oslepují.

Největší příčinou nedostatku taurinu je strava, která je z velké části založena na rostlinných prvcích. Místo toho, aby se společnosti vyrábějící krmiva pro domácí zvířata vrátily k přírodním pravidlům a snížily své ziskové marže, začali přidávat taurin jako doplněk stravy. Přídavek taurinu je při snaze vyřešit tento problém užitečný, ale vyvstávají otázky, zda to nedělá člověk, který si neuvědomuje další kritické prvky, které mohou v rostlinné stravě chybět.

Je proto důležité, aby si člověk uvědomil, že nemá právo odchýlit se od přirozeného řádu kočičí stravy - od toho, k čemu jsou kočky od přírody určeny. Kdybychom se zeptali na počet koček, které zemřely na nedostatek kompletní stravy, odpověď by pravděpodobně zněla "mnoho". Kočky mohou přežít na rostlinných bílkovinách, ale studie ukazují, že při takové stravě neprospívají správně. Zásadní je všímat si rozdílu mezi "přežíváním" a "prospíváním", protože se jedná o velmi odlišné zdravotní stavy.

Hrubé vaření také ničí živiny. Je nutné si uvědomit, že bílkoviny obsažené v suchém krmivu se vaří při velmi vysokých teplotách a po dlouhou dobu. Biologická hodnota zdrojů bílkovin se proto snižuje v důsledku rozsáhlého vaření, které je nutné k vysušení výrobku.

Odhaduje se proto, kolik živin a v jaké formě je poškozeno, aby se určily ztráty způsobené touto metodikou vaření. Poté se pokusí přidat je zpět do rostlinné nebo suché stravy.



Člověk však přírodu neovládá a nemůže rozumět jejímu dění a chování. Proto nikdy nebude znát všechny detaily obvyklé kočičí kořisti. Proto existuje obrovské riziko, když si člověk nechá svou chamtivostí a arogancí diktovat jídelníček kočky. Pokud jde o celkové množství bílkovin v krmivu, nenechte se přesvědčit výčtem procent bílkovin v rostlinných bílkovinách nebo suchých krmivech ve srovnání s konzervami nebo živočišnými bílkovinami. Mohlo by se zdát, že suché krmivo má vyšší množství bílkovin než konzerva, ale to zdaleka není pravda.

Chcete-li to zjistit, použijte základ sušiny; většina konzervovaných potravin obsahuje více bílkovin než suché potraviny. Nezapomeňte také, že větší je biologická hodnota bílkovin a že procentuální čísla vypovídají jen napůl nebo vůbec.

KAPITOLA 3

Krmíme kočky příliš velkým množstvím sacharidů

Kočky mají jedinečný biologický systém, který z nich činí skutečné masožravce, a proto by v přirozeném prostředí nekonzumovaly vysoké množství sacharidů (obilovin), které se nacházejí v suchých krmivech. Tato suchá krmiva jsou hlavní běžně podávanou stravou koček.

Nikdy byste se nesetkali s kočkou, která si dehydratuje myš a přikusuje k ní lepkové suflé z kukuřičné mouky, nebo se honí za stádem sušenek, které běží po afrických pláních. Místo toho by vaše kočka ve volné přírodě konzumovala stravu bohatou na bílkoviny a maso, s vysokým obsahem vlhkosti, mírným množstvím tuku a pouze s přibližně 3-5 procenty sacharidů a kalorií.
Průměrná suchá krmiva obsahují až 50 % kalorií ze škrobu, zatímco některá levnější krmiva rostlinného původu obsahují ještě více, a to není strava, kterou Stvořitel pro kočky zamýšlel.

Kvalitní konzervy však obsahují přibližně tři až pět procent sacharidových kalorií. Přesto je třeba mít na paměti, že ne všechny konzervy mají dostatečně nízký obsah sacharidů.

Kvůli absenci specifických enzymatických drah, které jsou přítomny u jiných savců, je u koček fyziologicky snížena schopnost využívat sacharidy. Kočkám také chybí slinný enzym zvaný amyláza.

Je důležité mít vždy na paměti, že kočky sacharidy nepotřebují a neustálé krmení takovou stravou může způsobit vážné zdravotní komplikace. Proto se vymyká logice, abychom naše masožravce nadále krmili jako býložravce, protože by to bylo podobné jako krmit koně nebo krávy obilovinami s příchutí masa.
Důvodem, proč to většina lidí dělá i nadále, je to, že suché krmivo a obiloviny jsou levné, snadno dostupné, jednoduché a pohodlné.

Masožravci jsou uzpůsobeni ke konzumaci masa, nikoliv obilovin. Potřebují také dostatek vody ve stravě. Proto je krmení koček stravou bohatou na sacharidy, stravou chudou na vodu a rostlinnou stravou pro kočku nebezpečné.

KAPITOLA 4

Kočky potřebují velké množství vody v potravě

Tato kapitola je velmi důležitá, protože zdůrazňuje, proč ani bezobilná strava a strava s nízkým obsahem sacharidů nejsou optimálními krmivy pro kočky, a to s ohledem na to, že cenově dostupnější konzervy jsou lepší než jakákoli rostlinná strava na trhu.

Voda je velmi důležitou živinou, která přispívá k celkovému zdraví všech živých tvorů. K tomu je třeba připočíst skutečnost, že kočky mají ve srovnání s jinými druhy, například psy, velmi nízkou žízeň. Z tohoto důvodu se velmi doporučuje a doporučuje, aby kočky dodržovaly stravu bohatou na vodu. Pokud převážnou část jejich stravy tvoří potrava, způsobuje to nízkou, chronickou dehydrataci, protože kočka má nedostatečný žíznivý pud.

Protože obvyklá kočičí potrava obsahuje přibližně 70 až 75 % vody, jsou kočky uzpůsobeny k tomu, aby získávaly vodu ze stravy. Konzervy
se více blíží přirozené stravě koček, protože obsahují až 5 % tuku.

Kočka, která dostává suché krmivo, spotřebuje poloviční množství vody ve srovnání s kočkou, která dostává konzervy.

Vzhledem k neustálým a častým problémům s ledvinami a močovým měchýřem, které se u koček vyskytují, je velmi důležité na to pamatovat. Jakmile kočka začne jíst vhodněji hydratovanou stravu živočišného původu, množství vylučované moči se zdvojnásobí, což je pro zdraví močového měchýře velmi povzbudivé. Pak je nutné častěji vynášet stelivo a v domácnosti přibývají další boxy.

Hrudkující stelivo je jedinou hygienickou možností, kterou můžete pro své kočky používat, protože je pohodlnější a hygieničtější než nehrudkující stelivo, které neumožňuje odstranit veškerou moč a také není hygienické.

KAPITOLA 5

Je důležité číst složení krmiva pro domácí zvířata

Problém vznikl zejména kvůli nedostatečnému množství použitelných informací, které obsahuje současný systém označování. "Zaručená analýza", která se objevuje na plechovce potraviny, nabízí pouze širokou škálu bílkovin, tuků, množství vody a mnoho dalšího, co je v potravině obsaženo. Můžete si tedy udělat představu o tom, co je v potravině obsaženo. V ideálním případě by mělo být nezbytné a nutné uvádět na konzervě výstižnější analýzy jako "krmné hodnoty".

Taková opatření však nemusí být zavedena v brzké době, a pokud by byla zavedena, byla by v souladu s informacemi, které se nacházejí na potravinách určených pro lidi.



Doporučujeme zeptat se výrobce a požádat ho o rozpis potravin z hlediska obsahu bílkovin, tuků a sacharidů. V ideálním případě by strava vaší kočky neměla obsahovat více než 10 % kalorií ze sacharidů.

KOČIČÍ BIBLE

Většina společností používá slova jako přírodní, holistický a prémiový, která nemusí nutně znamenat vysoce kvalitní potraviny.

Pokud vezmeme v úvahu optimální složení stravy, siamská kočka se příliš neliší od perské, mainské, mývalí nebo "kočky z uličky". Proto bez ohledu na typ plemene zůstává kočka obligátním masožravcem.

Kočky se také nepřestaly stávat masožravci, jakmile je člověk domestikoval, a proto je fráze "pouze do interiéru" pouze tržní strategií používanou firmami. Tato krmiva jsou většinou v suché formě a mají vysoký obsah sacharidů.

Diety na předpis - navzdory názoru většiny lidí nejsou tyto diety sestaveny pro optimální zdraví masožravců. Tyto diety na předpis prodávané ve veterinárních nemocnicích se většinou skládají z kukuřice, sóji a pšenice - potravin, které nemají v kočičí stravě co dělat, a navíc obsahují velmi mnoho sacharidů.

Vedlejší produkty - nemusí být nutně nekvalitní a mohou být velmi výživné a bohaté na bílkoviny. V porovnání se svalovinou se však jejich kvalita více liší. Vedlejší produkty jsou také levnější než svalové maso, takže si lze myslet, že stejně jako stojí dieta na předpis, mohly by tyto společnosti použít vyšší zdroj bílkovin.

Doporučujeme podávat kočce jiné vedlejší produkty než suché krmivo, pokud má krmivo živočišného původu nízký obsah sacharidů.

Problém, se kterým se většina lidí setkává, spočívá v tom, že značná část veterinárních lékařů je velmi málo vzdělaná, zejména v této oblasti výživy. Na veterinárních školách je tento obor považován za samozřejmost. Lze dokonce pozorovat potenciální střet zájmů, jakmile vyjde najevo, že mnozí z lidí, kteří tento předmět na veterinárních školách vyučují a poskytují rady praktickým lékařům, mají peněžní vazby na krmivářský průmysl.

To pak vedlo k tomu, že praktičtí lékaři formovali své dietní zájmy na základě doporučení, která přímo či nepřímo získali od průmyslu domácích zvířat. Takové průmyslové podniky nemají nejlepší zájem o vaši kočku a většinou jim jde jen o to, aby si připsaly další peníze na své účty.

Je také nutné si uvědomit, že většina léků na předpis podávaných ve veterinárních nemocnicích nemá žádné klinické studie, které by podpořily jejich použití při léčbě různých cílových onemocnění.

Jako první složku hledejte sval nebo maso, které pokud možno není orgánové, jako jsou játra. Pro identifikaci svaloviny se většinou uvádí nebo popisuje, kuřecí nebo krůtí a další podobné názvy, ale ne v označeních jako kuřecí vedlejší produkt nebo kuřecí vývar nebo dokonce játra. Vedlejší produkty - skládají se z nožiček, peří, vaječných skořápek a střev (méně výživné než svalovina).

Došlo k nešťastné skutečnosti, že se v komerčních krmivech pro kočky kvůli jejich cenové dostupnosti používají obiloviny, ačkoli by se v nich neměly vyskytovat. Výrobci a další instituce aby maximalizovaly své ziskové rozpětí. Je třeba vzít v úvahu, že kočky nejsou býložravci a že potřebují vysoký obsah masa. Pokud se tedy někdo rozhodne přidávat do kočičího jídelníčku obiloviny, mělo by to být v minimálním množství.

Stálé užívání obilovin způsobuje prudké zvýšení hladiny cukru v krvi kvůli vysokému obsahu sacharidů. Mezi obilné produkty, které toto způsobují, patří například sója, kukuřice a pšenice. Zásadnější je vždy zajistit, aby se sója ve stravě kočky nevyskytovala. Sója totiž obsahuje fytoestrogeny a také má negativní vliv na štítnou žlázu a hypertyreózu.

KAPITOLA 6

Běžné zdravotní komplikace koček s vazbou na jejich stravu

Diabetes

Cukrovka je velmi časté onemocnění koček, které je velmi nebezpečné a obtížně zvládnutelné. Výzkum ukázal, že když se sníží příjem sacharidů, riziko cukrovky se sníží a u koček, které již cukrovkou trpí, vede snížení příjmu sacharidů k mnohem lepší regulaci hladiny cukru v krvi.

Kromě tohoto závažného problému se sacharidy způsobuje obezitu také suché krmivo, zejména pokud je velmi kalorické, chutné a také volně podávané.

Je důležité být opatrný, protože většina veterinárních lékařů nesnižuje příjem sacharidů u diabetických koček dostatečně. Podceňují příznivý vliv, který má dieta s nízkým obsahem sacharidů na kontrolu hladiny cukru v krvi koček. Místo nákupu předepsaných léků, jako je Purina DM, což znamená Diabetic Management, můžete pro svou kočku udělat mnohem více tím, že ji budete krmit dietou s nízkým obsahem sacharidů; například konzervami, jako je Merrick. Vyberte jiný zdroj krmiva, pokud výše uvedená krmiva nejsou snadno dostupná nebo pokud je vaše kočka nemá ráda.

Onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin je pravděpodobně hlavní příčinou úmrtí většiny koček. Je třeba si uvědomit, že kočky jsou chronicky dehydratované, pokud jsou na stravě převážně rostlinného původu. Proto je šokující přemýšlet o tom, jakou roli může hrát chronická dehydratace při vzniku onemocnění ledvin koček. Mnoho koček je v dnešní době krmeno tekutinami a zároveň je jim podávána strava složená ze suchých krmiv.

To je velmi nelogické a nezdravé a kočky by měly být krmeny stravou bohatou na odpovídající obsah vlhkosti.

Jak již bylo uvedeno v této knize, takovou stravou jsou konzervy nebo potraviny živočišného původu.

Zánět močového měchýře

Cystitida je zánět močového měchýře. Pokud je vaše kočka na správně hydratované stravě s použitím "vody" a ne "krystalů" nebo "diet na předpis", což jsou nekvalitní krmiva používaná k manipulaci s pH moči, máte velkou šanci, že se nikdy nebudete obávat onemocnění, jako je zánět močového měchýře nebo ledvinové kameny. Pokud by lidé drželi své kočky na správné stravě živočišného původu, pak by se krystaly v moči a pH téměř ve všech případech staly bezproblémovými.

Vždy mějte na paměti, že jak již bylo zmíněno, kočka má velmi nízkou žízeň a je uzpůsobena k tomu, aby dostávala vodu s potravou.

Výzkum ukázal, že množství vody, které kočka konzumující konzervy spotřebuje, je dvojnásobné ve srovnání s kočkou konzumující suché krmivo, pokud se vezmou v úvahu všechny zdroje vody, tedy krmivo a miska s vodou.
Lidé, kteří krmí své kočky rostlinnou stravou, často tvrdí, že jejich kočky pijí velké množství vody. Ve skutečnosti však jejich kočka spotřebuje zhruba poloviční množství vody než kočka na živočišné bázi nebo v konzervě.

Kočka by měla jíst konzervy, ne suché krmivo. Je to proto, že každý živý tvor potřebuje k udržení optimálního zdraví vodu. Myslete na to, že konzervy slouží k tomu, abyste kočce několikrát denně vyčistili močový měchýř.

Další chybou, které se člověk dopouští, je bezuzdné zneužívání sacharidů, které se přidává ke stravě s nízkým obsahem vody a přílišným důrazem na pH a obsah sacharidů.

krystalky moči. Infekce jsou vzácnou příčinou onemocnění močových cest u koček, a proto by se v mnoha veterinárních službách nemělo denně předepisovat velké množství antibiotik.

Toto časté zneužívání antibiotik podporuje rezistenci bakterií a způsobuje chaos v těle kočky. Pacienti se zánětem močového měchýře dostávají zbytečně mnoho antibiotik.

Zánět močového měchýře je zánět stěny močového měchýře s infekcí nebo bez ní. Příčina tohoto bolestivého onemocnění nebyla dosud zjištěna, ale ví se, že souvisí se stresem a nízkým obsahem vody.

Příslušné statistiky

Většina diabetických koček nepotřebuje antibiotika, protože podle odhadů pouze jedno až dvě procenta koček s cystitidou a mladších deseti let mají infekci močových cest. Vzhledem k produkci vysoce koncentrované moči většina koček v této věkové kategorii nebo skupině prodělává tyto infekce jen zřídka. Je povzbudivé, že většina bakterií se ve vysoce koncentrované moči dobře nevyvíjí.

Starší kočky se zánětem močového měchýře by neměly automaticky dostávat antibiotika, i když infekce v tomto věku jsou častější, většinou dvacet až třicet procent oproti jednomu až dvěma procentům. Nezapomeňte, že sedmdesát procent těchto pacientů má sterilní cystitidu. Onemocnění ledvin jsou u starších koček častější, a proto je kočka v pokročilém věku náchylnější k infekcím močových cest. Budou mít proto více zředěnou moč, která není tak škodlivá pro růst bakterií.



Diabetes a hypertyreóza činí pacienta náchylnějším k infekci močových cest a častěji se vyskytují u koček starších deseti let. Je proto nutné zjistit, zda kočka trpí infekcí, či nikoliv, a v případě infekce je také nezbytné určit typ antibiotik, která je třeba vidět.

Laboratorní test kultivace a citlivosti (C&S) určí přítomné bakterie a informuje veterinárního lékaře, které antibiotikum by mělo být použito. Tento test trvá přibližně tři dny a provádí se v externí laboratoři. Moč je třeba získat přímo z močového měchýře pomocí cystocentézy, která zahrnuje použití injekční stříkačky a jehly. Pro kočku to není nijak strašně stresující procedura a tento postup je jediným zaručeným způsobem, jak odebrat vzorek pro přesnou analýzu, aby bylo možné adekvátně léčit pomocí antibiotik, případně jiných léků.

Jedním z problémů je, že kočky trpící tímto onemocněním často močí, a proto nemusí být v močovém měchýři dostatek moči, aby bylo možné získat vzorek. Proto je třeba několik hodin počkat. Aby se tento problém omezil, někteří veterinární lékaři podají pacientovi dávku podkožně, která je těsně pod kožními tekutinami. Kočka je poté uzavřena v kleci bez záchůdku a během několika hodin; močový měchýř je obvykle plný natolik, že je možné získat vzorek moči pomocí cystocentézy.

U všech pacientů se zánětem močového měchýře by mělo být provedeno laboratorní vyšetření kultivace a citlivosti (C&S), aby se zjistilo, zda se nejedná o jinou infekci. Kromě toho je důležité mít vždy na paměti, že musíme přestat používat antibiotika bez prokázaných podpůrných důkazů.
Jak již bylo řečeno, stres hraje rozhodující roli při vzniku zánětu kočičího močového měchýře. Proto je nutné pochopit začarovaný kruh zahrnující bolest a stres, protože je to zásadní pro zvládnutí tohoto onemocnění.

Bolest => stres a stres => zánět močového měchýře

Stručně řečeno, při prevenci a léčbě zánětu močového měchýře je nejdůležitější obsah vody ve stravě a zvládání stresu a bolesti. Proto se i u koček, které jsou krmeny stoprocentně živočišnou stravou, mohou vyskytnout období zánětu močového měchýře, ale mnohem méně často než u koček krmených rostlinnou stravou. Zánět močového měchýře je velmi frustrující onemocnění, které je natolik závažné, že ani veterinární odborníci nemají jednoznačný lék. Obsah vody v každodenní stravě lze snadno kontrolovat, protože stačí podávat konzervy s přidanou vodou, jak je uvedeno níže.

Kočky jsou velmi citlivé a ve stresu často mlčí; proto je tato otázka dalším bodem, který je třeba vždy zvážit.

Krystaly se od kamenů velmi liší a často jsou v moči kočky normálním nálezem. Proto není nutně vhodné nasadit kočce "speciální přípravek na močové cesty", pokud se v moči nebo močových cestách objeví.

Obecně se na identifikaci krystalů v moči klade velký klinický význam. Závažným stavem se však stává, jakmile se předpokládá, že krystaly jsou skutečné, bez ohledu na to, jak byly vzorky moči odebrány. Je to proto, že krystaly se tvoří

mimo tělo po dobu třiceti až šedesáti minut, a pokud veterinární lékař nevyšetří moč okamžitě, použije vzorek, který majitel přinesl z domova, nebo jej pošle do externí laboratoře, může dojít k nepřesné diagnóze krystalů
by se uskutečnila. Taková chybná diagnóza se proto nazývá "falešně pozitivní" hlášení. Výsledným faktorem jsou zbytečné starosti na straně majitele a také krmení kočky nevhodnou, nekvalitní stravou.

Jakou roli hraje strava v krystalech?

Pokud je vaše kočka na rostlinné stravě s malým množstvím vody, produkuje více koncentrované moči, která má vyšší specifickou hmotnost moči (USG), a produkuje menší objem moči, který je často poloviční než u kočky na konzervovaném krmivu. To má za následek vyšší koncentraci krystalů přítomných v moči.

Konečným důsledkem této vysoké koncentrace krystalů je zvýšená pravděpodobnost vzniku život ohrožujících ledvinových kamenů a u některých koček také velmi dráždí stěnu močového měchýře a způsobuje bolestivý zánět močového měchýře.

Přidání jedné až dvou polévkových lžic čisté nebo ochucené vody - např. škeble, džus, voda z tuňáka, kuřecí nebo hovězí vývar, na jedno jídlo živočišného původu je velmi vhodné a nezbytné, podobně jako při používání vodních fontán.

Pokud vezmete přibližně jednu plechovku tuňáka a smícháte ji se třemi šálky vody, můžete si vyrobit vlastní vodu s tuňákem. Postupujte tak, že ho rozmačkáte a necháte asi dvacet minut odstát. Nakonec vodu nalijte do zakrytých zásobníků na kostky ledu a zmrazte, abyste prodloužili čerstvost. Vždy nezapomeňte používat zakryté nádoby, abyste zajistili čerstvost vůně a chuti.

Pokud si stále děláte starosti s tvorbou krystalů, zvažte tuto analogii: Pokud vám na příjezdovou cestu padá listí, což je každodenní jev, hromadí se a způsobuje řadu různých problémů. Pokud si krystaly představíte jako listí, tak v této analogii lze snadno vypozorovat, že krmiva živočišného původu odvádějí mnohem lepší práci při čištění kočičího močového měchýře ve srovnání se suchými krmivy nebo krmivy rostlinného původu.

Mějte na paměti, že nález krystalů není neobvyklým aspektem. Škodlivým se stává spíše tehdy, když při pravidelném krmení kočky nadále používáte stravu ochuzenou o vodu. Kameny nebo velké množství krystalů mohou například způsobit vážné prasknutí močového měchýře tím, že brání odtoku moči.

U kočky, která často navštěvuje záchod a nevyprazdňuje moč, je nutná okamžitá lékařská pomoc. Proto se doporučuje používat hrudkující stelivo. Hrudkující stelivo umožňuje majiteli sledovat, kolik moči kočka vylučuje, pokud vůbec nějakou. Zjistěte, zda je kulička moči velká asi jako rozinka, hroznové víno, golfový míček, švestka nebo tenisový míček. Protože není možné odstranit všechnu moč několikrát za den, automaticky to znamená, že nehrudkující stelivo není dostatečně hygienické. Kromě této důležité skutečnosti také neumožňují majiteli kvantifikovat množství vyměšované moči.

Přestože se při diskusi o krystalech močových cest často uvažuje o pH moči, není již nutné se na pH soustředit. Zde je rozhodující dostatečné množství vody, nikoliv pH moči.

Jedinou výjimkou by bylo dočasné jedno až dvouměsíční užívání konzervy Hill's s přídavkem vody jako okyselující diety na předpis při struvitových kamenech. Můžete také zvolit použití značného množství struvitových krystalů, zejména u kocoura. Přijetí tohoto opatření je způsobeno tím, že kocouři mají dlouhou a úzkou močovou trubici, což je vystavuje většímu riziku život ohrožujícího ucpání. Tato dieta by se však neměla používat pro dlouhodobé krmení.

Je třeba si také uvědomit, že šťavelan vápenatý se tvoří v kyselém prostředí. Pokud se tedy u kočky objeví kameny nebo krystaly šťavelanu vápenatého, má to fatální následky. Aby bylo možné sledovat pokrok nebo dokonce nedostatek pokroku, měla by být kočka znovu vyšetřena pomocí rentgenu nebo ultrazvuku během tří až čtyř týdnů po zahájení diety. Mohou se objevit i případy pomalého růstu nebo neznatelného pokroku, což ještě více zdůrazňuje nutnost použití ultrazvuku nebo rentgenu.

Mnohé volně prodejné diety pro kočky se nedoporučují používat. Jsou vyráběny tak, aby pacientům zvyšovaly kyselost moči, ale má se za to, že tato krmiva s nízkým obsahem hořčíku a okyselující moč jsou lékem na bolestivý zánět močového měchýře. Kromě toho mohou také způsobit hypokalémii, což je nízká

hladina draslíku v krvi, a často mají za následek podporu oxalátu vápenatého, který může způsobit onemocnění ledvin.

Je také důležité si uvědomit, že strava je jediným faktorem, který určuje hladinu pH u koček, kromě velkého množství dalších faktorů, které rovněž plní tuto úlohu.

Pokud jde o suché krmivo a zdraví močových cest, kromě nedostatku vody v tomto typu každodenní stravy existuje také koexistence mezi konzumací stravy s vysokým obsahem sacharidů, která se většinou nachází v suchém krmivu, a tvorbou struvitových krystalů. Jediným vysvětlením této skutečnosti je, že potraviny na bázi sacharidů podporují zásaditou moč.

Veterinární lékaři nejčastěji předepisují Hill's Prescription dry c/d a x/d při problémech s močovými cestami. Výzkum však ukázal, že tyto stravy obsahují pouze deset procent vody a také velké množství druhově nevhodných složek a pochybných konzervačních látek. Takové diety se nedoporučují pro krmení obligátních masožravců, jako jsou kočky.

Zánětlivá střevní onemocnění (IBD)

Mezi příznaky zánětlivého onemocnění střev (IBD) patří zvracení, zácpa a průjem u koček. Jediným klinickým příznakem, který je většinou pozorován v případech bolestivého onemocnění střev, je úbytek hmotnosti. Zdá se, že je ideální zahájit léčbu gastrointestinálních problémů u kočky druhově vhodným způsobem krmení. Taková léčba je nezbytná, protože v souvislosti s tímto onemocněním koček existuje mnoho nezodpovězených otázek.

Běžnými terapeutickými problémy, kterým je třeba se vyhnout, je však pokračující a neustálé užívání diet na předpis, které mají vysoký obsah sacharidů, a vysoké množství steroidů. Výzkum ukázal, že u koček došlo k výraznému zlepšení zánětlivé střevní onemocnění, když byla z jídelníčku vyřazena veškerá suchá strava. jejich stravu.

Pro zdůraznění tohoto bodu existují četné zprávy, které uvádějí, že kočky trpící touto nemocí se výrazně zlepšily na vyvážené stravě s nízkým obsahem sacharidů, lehce vařené nebo syrové. V neposlední řadě je třeba se více zaměřit

na krmení pacientů koček druhově vhodnou stravou, než spoléhat na steroidy, které jsou buď dlouhodobě, nebo dočasně v některých případech nezbytné.

Obezita

Obezita je u koček velmi častým a mimořádně závažným zdravotním problémem. Studie například prokázaly, že kočky s nadváhou jsou vystaveny největšímu, až čtyřnásobnému riziku vzniku cukrovky než kočky s optimální hmotností. Obézní kočky se také nedokážou správně čistit a je u nich vyšší pravděpodobnost vzniku ortopedických problémů.

Obligátní masožravci, jako jsou kočky, jsou stvořeni nebo navrženi tak, aby uspokojovali své energetické nároky pomocí stravy s vysokým obsahem bílkovin, malým nebo žádným množstvím škrobu a středním obsahem tuku.



Pro energetické účely se využívá malé množství sacharidů, zatímco zbytek se přeměňuje na tuky. Na trhu najdete lehce tepelně upravené diety, které se zaměřují na obsah tuku jako na živinu, jejíž obsah je třeba snížit. V ideálním případě by taková opatření znamenala pouze to, že by člověk musel zvýšit buď obsah sacharidů, nebo bílkovin ve stravě.

Je třeba si uvědomit, že výrobci krmiv pro domácí zvířata zvyšují obsah sacharidů v krmivech, protože bílkoviny nebo maso jsou dražší než škrob nebo obiloviny. Tím, že zvyšují obsah krmiva, způsobují nakonec druhově nevhodnou a nezdravou stravu.

Optimální dieta pro hubnutí by měla mít vysoký obsah bílkovin, což je více než čtyřicet procent kalorií, mírný obsah tuků, což je méně než padesát procent kalorií, a nízký obsah sacharidů, které tvoří méně než deset procent kalorií. Řada krmiv Merrick je dokonalým příkladem takto profilované stravy.

Zde je hlavním cílem zbavit se tuků a zároveň si zachovat svalovou hmotu. Většina koček na méně aktivních nebo lehkých dietách však prochází dva procesy, jeden je, že vůbec neztrácejí váhu, nebo dva, ztráta váhy je také doprovázena ztrátou svalové hmoty.

Několik výzkumných institucí a studií prokázalo, že kočky krmené dietou s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem škrobu zhubly, ale přesto si zachovaly svalovou hmotu ve srovnání s kočkami, které byly krmeny dietou s vysokým obsahem sacharidů a nízkým obsahem masa, bílkovin nebo tuku. Nezapomeňte také, že krmení koček stálou lehkou stravou s cílem snížit jejich hmotnost je nevhodné. Výsledným faktorem bude, že majitel nebo ošetřovatel kočky skončí s nadváhou, mrzoutstvím nebo dokonce s hubenou kočkou, která mohla ztratit příliš mnoho libové tělesné hmoty.

Jaterní lipidóza (ztukovatění jater)

Jedná se o smrtelné onemocnění koček, které způsobuje ztrátu chuti k jídlu na více než dva dny a je nejčastějším metabolickým onemocněním jater koček. U koček s nadváhou nebo obézních koček je pravděpodobnost diagnózy hepatální lipidózy vyšší, ale i štíhlé kočky mají šanci toto smrtelné onemocnění získat.

Krmení koček dietou s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem škrobu pomáhá udržovat jejich zdravou, optimální tělesnou hmotnost, a tím snižuje pravděpodobnost, že skončí s tukovým onemocněním jater.

KOČIČÍ BIBLE

Onemocnění zubů

Mnoho majitelů koček věří dlouhodobému tvrzení, že kočky, které jsou krmeny stravou bohatou na rostlinnou stravu, mají menší pravděpodobnost onemocnění zubů než kočky, které jsou krmeny přísně živočišnou stravou nebo konzervami.

Takové názory, často vytvořené chamtivými veterináři, nadále ohrožují zdraví koček tím, že jim stále tvrdí, že jejich misky s potravou musí být plněny takovou nezdravou stravou, aby si udržely čisté zuby. Tato myšlenka nebo myšlenková škola, jak by někteří řekli, je podobná ideologii, že křupavé sušenky nebo piškoty podporují zdraví zubů i u lidí.



Důvody pro absurditu takových tvrzení jsou následující:
1. Suché potraviny jsou tvrdé, ale křehké, lámou se a tříští jen s malým nebo žádným abrazivním účinkem.
2. Kočičí čelisti jsou navrženy nebo určeny k trhání a stříhání masa, ale ne ke kousání suchých rostlinných materiálů.
3. Mnoho koček tato suchá krmiva nežvýká, ale polyká je vcelku.

KOČIČÍ BIBLE

Existuje mnoho známých i neznámých faktorů, které podporují onemocnění a selhání zubů. Patří mezi ně genetika, viry, strava a nedostatečné čištění zubů kočky. Uprostřed všech těchto nezodpovězených otázek je však nejzřejmější odpovědí skutečnost, že člověk se musí vyvarovat krmení koček potravou, kterou by jinak ve svém přirozeném stavu nekonzumovaly.

Vezměme si příklad koček ve volné přírodě. Trhají a stříhají maso, kosti, kůže, vazy a šlachy. Proto existuje rozdíl, když porovnáte takovou stravu bohatou na bílkoviny a maso s příjmem druhově nevhodných suchých krmiv.

Všem kočkám se doporučuje podávat stravu bohatou na bílkoviny a maso, například velké kusy masa, které kočka může žvýkat. Lze také přidávat žaludky, které jsou robustní a bohaté na vlákninu. Nejlépe poslouží syrové maso, které je tužší na žvýkání než maso vařené. Taková strava povede k podpoře zdravého stravování.

Při krmení kočky bílkovinnou dietou je důležité mít na paměti, že tvoří pouze část stravy. Proto je nezbytné, abyste ve zmíněném krmivu míchali maso i kosti. Důvodem je to, že kosti jsou bohaté na vápník a fosfor, které jsou užitečné pro posílení zubů a kostí. Také kočičí kořist neobsahuje pouze maso, ale skládá se také z kostí, a proto je nutné, aby se každá strava na bázi zvířat snažila podobat přirozené potravě kočky. Všimněte si, že krmení kočky pouze masnými výrobky způsobuje, že strava je velmi nevyvážená.

Při podávání rostlinného masa jako doplňku k většině komerčních konzerv je bezpečné podávat méně než patnáct procent denních kalorií.

Nejlepší způsob, jak podpořit zdraví zubů vaší kočky, je pouze čištění zubů. Dělejte to co nejčastěji. Navíc byste měli své kočky průběžně a pravidelně krmit velkými kousky masa.

Mnoho koček pociťuje bolest v tlamě, ale nevykazuje žádné vnější známky této bolesti. Pokud se pokusíte vyčistit kočce zuby, když prožívá takovou bolest, způsobíte jen to, že bude vyděšená a vystrašená, a může si také vypěstovat silnou fobii vůči zubním kartáčkům. Pokud k tomu dojde, může se stát, že po konzultaci s veterinárním lékařem už nikdy nepřistoupí na čištění zubů.

Je důležité si uvědomit, že konzervy nejsou jediným řešením problémů s onemocněním zubů. Měli bychom se však zbavit představy, že suché krmivo podporuje zdraví zubů.

Kočičí astma/alergické onemocnění dýchacích cest

Studie prokázaly, že u mnoha koček po nasazení diety bez sacharidů nebo obilovin nebo diety připravované doma na bázi masa zcela vymizely nebo se výrazně zmírnily respirační příznaky, jako je kašel nebo dýchací potíže. Některé z těchto respiračních příznaků mohly být způsobeny tím, že trpící kočky reagovaly na bílkoviny v krmivu, které se zejména v suchých krmivech vyskytují ve velkém množství. Stejně tak mohly reagovat na antigeny roztočů nebo švábů, které se nacházejí v rostlinných nebo suchých krmivech.

Je smutné, že většina koček, u nichž se projevuje vyčerpávající plicní onemocnění, dostává imunosupresivní dávky steroidů, přičemž jsou stále krmeny druhově nevhodnou stravou. Příčinou problému mohou být druhově nevhodné obiloviny a antigeny hmyzu. Proto podávání steroidů kočce nemusí tento problém vyřešit. Je důležité zjistit, zda je strava skutečnou příčinou respiračních příznaků kočky. Je to nezbytné, protože steroidy mohou u koček způsobit cukrovku a také je učinit zranitelnými vůči infekcím způsobeným bakteriemi, viry a plísněmi.

KAPITOLA 7

Bezpečnost suchých potravin a změna stravy

Bezpečnost suchých potravin

Je třeba poznamenat, že suché krmivo nelze označit za zcela čisté, bezpečné a bez choroboplodných zárodků. Skutečně se vyskytly případy, kdy bylo suché krmivo staženo z trhu kvůli přítomnosti bakterií, skladištních roztočů, smrtelně nebezpečných chemických látek a mykotoxinů.

Změna stravy - přechod ze suchých potravin na konzervy

Nejvhodnější doba pro změnu stravy vaší kočky je, když je zdravá. Zavedení nové stravy pro kočku, která není v pořádku, může být špatný nápad, protože to může

skončit docela hektickou záležitostí až do té míry, že se kočka začne jídla štítit, pokud si ho spojí se svými potížemi.

Nemocné kočky mohou mít v důsledku nemoci sníženou chuť k jídlu, což vede k nižšímu příjmu potravy, a tím i ke snížení příjmu kalorií. Proto není nejvhodnější doba pro zavedení nové stravy.

Pro pacienty s problémy s močovými cestami je velmi důležité přijímat vodu v dostatečném množství. Protože se však předpokládá, že zánět močového měchýře (zánět stěny močového měchýře) souvisí se stresem, je důležité přistupovat ke změně stravy pomalu a jemně, aby se stres, který může být spojen se zavedením nové diety, omezil na minimum.

Když se snažíte kočku přimět jíst konzervy, můžete zvýšit příjem vody pomocí ochucených vod, jako je například hovězí vývar, škeblový džus nebo kočičí mléko. Vodu z tuňáka lze připravit tak, že do konzervy tuňáka přidáte 3 šálky vody, rozmačkáte ji a necháte asi 15 minut odstát, než vodu nalijete do zakrytých zásobníků na kostky ledu.

Na naplnění dvou zásobníků na 16 kostek stačí 3 šálky vody. Pomocí zásobníků na kostky ledu lze připravit i jinou ochucenou tekutinu.
Před použitím je třeba kostky ledu zahřát na teplotu "myšího těla" a poté přidat 1 nebo 2 polévkové lžíce na jedno jídlo v konzervě. Ohřáté kostky ledu lze také dát do samostatné misky jako jiný nápoj s vodou.

Je nutné podotknout, že nejsem proti podávání konzerv nemocným kočkám. Možná budete dokonce překvapeni, že kočka dává přednost konzervám před suchým krmivem. Mějte výše uvedené připomínky a informace na paměti, až budete procházet procesem změny stravy, a zajistěte, aby byl příjem kalorií vaší kočky dostatečný.

Frustrace, které s sebou přináší jednání s dotěrnou kočkou, nemají obdoby. Mohou být velmi náročné na stravu. Hodně lidí na otázku, zda se snaží svým kočkám zajistit zdravější stravu, odpovídá, že jejich kočky nechtějí jíst konzervy, nebo že zřejmě milují suché krmivo.

KOČIČÍ BIBLE

Přechod nespočívá jen v tom, že kočce dáte nové krmivo. Často je zapotřebí čas, trpělivost a jemnost.

Firmy vyrábějící krmiva pro domácí zvířata vyrábějí tato suboptimální suchá krmiva s velmi lákavými spreji, díky nimž si cílové zvíře přirozeně oblíbí nekvalitní stravu.

Suché krmivo má navíc na rozdíl od konzerv křupavou strukturu, a jakmile si ho kočka oblíbí a zvykne si na něj, je velmi odolná vůči drastickým změnám struktury krmiva.

Klíčové je dělat to pomalu, nespěchat a používat různé triky. Celá myšlenka spočívá v tom, abyste změnu provedli v dlouhodobém horizontu, ne v tom, jak dlouho vám bude trvat, než změnu provedete. Po krmení suchým krmivem od jejich narození se moje kočky, jejichž věk se pohybuje od 2 let do 10 let, během tříměsíčního přechodu ze suché stravy na konzervy prověřila mou trpělivost až do krajnosti.

Jednou z velkých chyb, které se dopouští mnoho lidí, je panika, když se jejich kočka nového krmiva nedotkne, a tak se rozhodnou dávat kočce suché krmivo, na které je zvyklá. Mnoho lidí si neuvědomuje, že dostat kočku ze suchého krmiva není procházka růžovým sadem.

Kočky lze rozdělit do dvou kategorií: ty, které budou jíst konzervy, a ty, které se brání všemu jinému než suchému krmivu. Máte štěstí, pokud vaše kočka patří do první kategorie, protože při přechodu nebudete mít potíže. V této situaci, pokud se vaše kočka dosud živila výhradně suchým krmivem nebo se občas krmí konzervami, začněte s podáváním konzerv ve stále větším množství a zároveň snižujte množství suchého krmiva. Úplný přechod kočky na plně konzervovanou stravu trvá přibližně týden.

Během přechodného období mohou mít kočky měkčí stolici. Obecně by se nemělo jednat o nic se obávat, protože je to důsledek změny stravy. Chcete-li se s tím vypořádat, můžete buď experimentovat s různými konzervovanými potravinami nebo celý proces přechodu zpomalit.

a provést ji v průběhu několika týdnů namísto dříve uvedeného jednoho týdne.

KOČIČÍ BIBLE

Ačkoli obecné zásady uvádějí, že průměrná kočka by měla denně sníst 4-6 uncí konzervy, měli byste to u své kočky v přechodném období zjednodušit.
Pokud vaše kočka patří do druhé kategorie, máte co dělat. Některé kočky, které byly na suché stravě, mohou být vůči změně stravy poměrně odolné a může trvat delší dobu, než se jim podaří přejít na zdravější stravu.

U tvrdohlavých koček budete potřebovat využít normální pocity hladu, což znamená. budete muset přestat volně podávat suché krmivo a stanovit časy jídla.

Kočky nepotřebují mít jídlo neustále k dispozici a je dovoleno, aby pociťovaly hlad. Přestože jsem byla přesvědčená, že to dělám pro vyšší dobro, bylo pro mě těžké snažit se ignorovat volání a prosby o jídlo od mých koček. Kočky i já jsme v tomto období měli dlouhé dny a dodnes si myslím, že se to podepsalo spíše na mně než na kočkách samotných. Právě v tomto bodě zoufalství člověka i kočky většina lidí často selhává a vzdává se. V určitém okamžiku jsem musela zavolat svému "rádci" a bylo mi doporučeno, abych opustila dům, když se celá situace stala neúnosnou.
Na druhou stranu je třeba stanovit limit, jak dlouho budou vaše kočky hladovět v naději, že se dostanou do bodu zoufalství, kdy budou schopny sníst téměř cokoli.

Nedoporučuji je "hladovět" déle než 24 hodin, protože zde nejde o mučení, ale o snahu přesvědčit je, že kvalitní konzerva je pro ně skutečně dobrá. Nechat kočku hladovět déle než dva dny může být nebezpečné, zejména pro kočky s nadváhou. Může vést k ztukovatění jater (hepatální lipidóze). Jaterní lipidóza může vzniknout také tehdy, když kočka po delší dobu konzumuje méně než polovinu denní potřeby kalorií. Toto delší období se u jednotlivých koček liší, proto je důležité, abyste měli představu o množství kalorií, které vaše kočka během přechodného období denně zkonzumuje ze suchého a konzervovaného krmiva dohromady. Toto číslo se nepočítá na základě hmotnosti tuku, ale na základě libové tělesné hmotnosti.

Pokud vaše kočka váží 20 liber, ale ve skutečnosti by měla vážit 14 liber, zajistěte, aby vaše kočka přijímala alespoň 210 kalorií denně (14 liber libové tělesné hmotnosti X 15 kalorií/libra/den = 210 kalorií/den).
Pokud máte malou kočku, která by měla vážit 10 kilogramů, měli byste jí denně zajistit příjem alespoň 150 kalorií.

U suchých potravin je obsah kalorií obvykle uveden na sáčku, takže je poměrně snadné zjistit jejich příjem. Naproti tomu u konzervovaných potravin se obsah kalorií na sáčcích nikdy neuvádí. Existuje však hrubý odhad obsahu kalorií většiny konzerv, které mají 78% vlhkost, a to 30 kalorií/unci při přechodu na konzervované potraviny.

To je dobře, protože větší procento koček má i tak nadváhu. Vždy byste však měli bedlivě sledovat, jak rychle kočka tuto váhu ztrácí. Kočka by neměla hubnout příliš rychle. Kočka by nikdy neměla ztratit více než 1-2 % tělesné hmotnosti během jednoho týdne. Bezpečná hranice se blíží 1 % a jakákoli vyšší hodnota by měla být červeným signálem, že se někde něco pokazilo.

V této souvislosti doporučuji kočky pravidelně vážit, aby byl zajištěn bezpečný a zdravý přechod na zdravější stravu, a upozorňuji, že úbytek hmotnosti je často jedním z prvních příznaků špatného zdravotního stavu. Já osobně své kočky vážím nejméně dvakrát ročně.

Dětská váha Health-O-Meter HDC 100-01 zaznamenává hmotnost s přesností na půl unce a je vybavena tlačítkem pro přidržení, které pomáhá získat přesnou hmotnost i u kočky, která se pohybuje.

Všechny mé kočky během tří měsíců přechodu trochu zhubly, ale žádná z nich nebyla příliš hubená. Ztratily tuk a zároveň si zachovaly svalovou hmotu, což znamená, že zhubly na pěknou štíhlou váhu a staly se také aktivnějšími. Připravte se na to, že budete občas frustrovaní a že bude docházet k plýtvání konzervami, protože kočky nad nimi ohrnují nos. Možná také budete chtít okamžitě převést kočku na suché krmivo, jehož obsah kalorií ze sacharidů je nižší než u ostatních suchých krmiv.

Tyto suché potraviny s nízkým obsahem sacharidů mají vysoký obsah tuku, takže jsou velmi kalorické. Jejich konzumaci je třeba dobře sledovat, jinak může vaše kočka přibrat na váze. Příkladem je Innova EVO, která má podle údajů na sáčku 612 kalorií na kelímek. To znamená, že čtvrtina kelímku obsahuje 153 kalorií, takže si dávejte pozor, kolik těchto krmiv kočce podáváte.

KOČIČÍ BIBLE

Průměrná kalorická potřeba kočky se obvykle pohybuje mezi 150 a 250 kaloriemi denně v závislosti na její tělesné hmotnosti a úrovni fyzické aktivity.
Tato krmiva s nízkým obsahem sacharidů mají také velmi vysoký obsah fosforu, což může být problematické pro kočky s oslabenou funkcí ledvin.

Tyto suché potraviny s nízkým obsahem sacharidů neobsahují vodu, protože se vaří při velmi vysokých teplotách jako jiné suché potraviny, aby se vysušily.
Tyto nízkosacharidové potraviny bych nedoporučoval pro dlouhodobé krmení ze všech výše uvedených důvodů. Doporučuji je používat pouze jako přechodnou stravu.

Vyhněte se jakýmkoli "light" druhům, protože tyto druhy potravin mají vysoký obsah sacharidů.

Zde je několik triků pro ty z vás, kteří se potýkají s tvrdohlavými kočkami. Mějte však na paměti, že na různé kočky fungují různé metody:

- Pokud vaše kočka dosud dostávala suché krmivo na základě volného výběru, převezměte krmivo a vytvořte krmný plán 2-3krát denně. V období přechodu je preferuji dvakrát denně, protože průměrný zdravý hlad po 12 hodinách může kočku ovlivnit, aby ochutnala něco nového.

- Jakmile skončí přechodné období a kočka je nyní na konzervě, jsem zastáncem buď volného krmení, nebo tří krmení během dne. Nemám problém nechat konzervy venku i 12 hodin, protože vím, že kočky nesní celé jídlo najednou, stejně jako jejich divoké protějšky.

- Tipem, jak u koček krmených volně je přechod velmi pozvolný, je vzít množství, které kočka přijímá, a rozdělit ho na dvě jídla, aby si kočka zvykla. Většina lidí však nemá jasnou představu o tom, kolik jejich kočka krmená volně žere, proto je vhodné nejprve zjistit, kolik kalorií vaše kočka potřebuje k udržení své hmotnosti, pokud nepotřebuje snižovat váhu.

- Jak již bylo zmíněno, většina koček potřebuje 150 až 250 kalorií denně. Sáčky suchého krmiva mají na sobě napsáno, kolik obsahuje kalorií, takže by vám měly říct, kolik kalorií je v jednom kelímku krmiva.

- Dejte kočce 20 minut po položení jídla a pak jí nesnědené jídlo odeberte. Tento postup by se měl opakovat za 8 až 12 hodin v závislosti na vašem krmném plánu. V prvních dnech přechodu na nový program lze podávat konzervy mezi jídly nebo během jídla suchého krmiva. Nezoufejte, pokud se tvrdohlavci konzervy nedotknou, protože nakonec všechny kočky nakonec budou jíst konzervy, pokud je člověk, který na přechod dohlíží, dostatečně odhodlaný, trpělivý a metodický. Uvidíte, že vaše kočka bude nadšenější, jakmile dostane pevný rozvrh, a bude ještě otevřenější vyzkoušet něco nového.

- Jakmile si sestavíte plán, můžete začít snižovat množství jídla během každého jídla, takže nakonec začne obvyklý pocit hladu pracovat ve váš prospěch. Všimněte si, že nejdůležitějším faktorem zde není nechat kočku vyhladovět na novou stravu, ale využít tento pocit hladu k tomu, aby nám pomohl.

- Až si kočka konečně zvykne na krmení jídlem namísto volného krmení, zkuste zavést krmení pouze konzervami. V tomto případě je třeba být trpělivý, protože řada koček může krmivo odmítat. Nedělejte to se však vzdát suchého krmiva. Pokud kočka odmítá jíst, vyzkoušejte další tipy uvedené zde. Pokud ani to nezabere, nechte kočku trochu vyhládnout, než jí znovu nabídnete konzervu. Zkuste znovu další triky, ale jakmile uplyne 18 hodin od doby, kdy kočka naposledy něco jedla, dejte jí jen malé množství suchého krmiva, ale nezapomeňte sledovat denní příjem kalorií, protože je to důležité.

KOČIČÍ BIBLE



- Nezapomeňte, že nejdůležitější je trpělivost.

- Cvičení a hraní si s kočkou před jídlem může pomoci zvýšit její chuť k jídlu.

- Udělejte z času krmení čas na hru. Místo toho, abyste dávali jídlo do misky, vymyslete zápas jako je házení suchého krmiva přes celou místnost, aby kočka běhala sem a tam. Tento trik dobře funguje u koček, které potřebují snížit svou váhu.

- Hra s kočkou v době jídla jí pomůže spálit kalorie a měla by povzbudit její chuť k jídlu, aby mohla být vnímavější ke konzervě. Je to také možnost, jak se s kočkou sblížit a komunikovat, čímž se zbavíte nudy nebo stresu, který zažívá mnoho koček, které zůstávají doma.

- Je dobré uchovávat krmivo v těsně uzavřených nádobách nebo prostorách, aby kočka neměla ostrý čich, který by suché krmivo v domě odhalil. Buď to, nebo držte krmivo zcela mimo dům, aby si kočka pro jídlo chodila k vám.

- Mně se osvědčily tyto konkrétní triky: posypte konzervu malým množstvím pamlsku. Pochoutkou může být cokoli, například tuňák nebo kuře v závislosti na preferencích kočky. Když kočka začne jíst, vtlačte pamlsek do vrchní části nového krmiva. Pokud používáte jako pamlsek rybu, nezapomeňte co nejdříve snížit její množství, protože pokud je převažující složkou stravy ryba, mohou se objevit zdravotní problémy.

- Dbejte na to, abyste kočce nepodávali studené jídlo přímo z lednice. Kočky mají rády jídlo o teplotě "myšího těla", takže se ujistěte, že jste jídlo, které bylo předtím uloženo v chladničce, ohřáli.

- Zkuste zavést vařenou nebo syrovou stravu, například kuřecí maso, celé maso nebo dokonce dětskou výživu. Celá myšlenka spočívá v tom, že kočce představíte potravu, která nekřupe jako suché krmivo a umožní kočce zvyknout si na novou strukturu. Kromě toho je kuřecí maso dokonalým zdrojem bílkovin, což je jeden ze způsobů, jak kočku přivést ke konzumaci krmiva s nízkým obsahem sacharidů.

- Bylo zjištěno, že většina koček miluje parmazán, proto jím zkuste posypat konzervy. Možná vám to pomůže.

- Existuje jeden konkrétní produkt s názvem FortiFlora. Jedná se o probiotikum vyráběné společností Purina, ale v tomto případě se používá jako zvýrazňovač chuti krmiva pro kočky. Je známo, že kočky FortiFloru milují, protože její základní složkou je živočišný digest - stejná látka, kvůli které kočky šílí po suchém krmivu. Posypte jím konzervy stejně jako jinými pamlsky.

- K dispozici je také celá řada sušených masových pamlsků, kterými lze posypat konzervy, přičemž jednou z nejoblíbenějších je Halo`s Liv A Littles. Nabízí se otázka, proč suché krmivo prostě nenamočit do tekutiny, například do vody, aby se změnila struktura? Suché krmivo má vysoký obsah bakterií a často obsahuje plísně. Byly zaznamenány případy, kdy psi a kočky zemřeli po konzumaci krmiva opatřeného plísňovými mykotoxiny, vomitoxiny a aflatoxiny. Bakteriím a plísním se totiž daří ve vlhku, takže pokud máte v úmyslu suché krmivo zředit vodou, dejte mu jen 20 minut až půl hodiny a pak zbytek vyhoďte. • Kočku můžete krmit suchým krmivem

namočeným ve šťávě z konzervy. Dobře, značná část koček může odmítnout jíst, pokud by se tolik dotýkalo konzervy, ale přesto to stojí za vyzkoušení.

- Můžete také zkusit přidat několik malých kousků konzervy a smíchat je se suchým krmivem. Kočce se může podařit kousky vybrat a kousky konzervy dokonce opustit, ale díky tomu si kočka časem zvykne na vůni a strukturu. Suché krmivo můžete rozdrtit a posypat jím konzervy.

- Existuje tip, který se osvědčil u nedávno odstavených koťat. Spočívá v tom, že kočce potřete dásně trochou konzervy, což může vyvolat zájem kočky o novou chuť a usnadnit jí konzumaci konzervy umístěné v misce. Tento postup je třeba provádět opatrně, protože nechceme kočce znepříjemnit situaci a riskovat, že si vytvoří odpor k jídlu.

- Pokud vaše kočka dosud nepřijímala konzervy, můžete předtím, než budete předpokládat, že je tvrdohlavá, zkusit používat různé značky a příchutě konzerv. Na stránkách můžete také zkusit míchat různé příchutě konzerv, protože mnoho koček miluje krmiva, která jsou tvořena pouze vedlejšími produkty.

- Další možností je krmení stříkačkou. Jedná se o ruční krmení kočky krmivem ze stříkačky, které se vkládá do tlamy. Měli byste kočku držet v poloze na zemi a najít způsob, jak jí stříkačku vsunout do tlamy a podávat jí malé množství najednou. Cílem této techniky není podávat kočce plnohodnotné jídlo, ale pouze jí představit cizí chuť a strukturu. Tato metoda vyžaduje precizní trpělivost a jemnost, aby kočku nestresovala a opět se vyhnula averzi k jídlu. Hrotem stříkačky projde jen několik málo konzerv, takže byste měli pečlivě vybírat, které to jsou, podobně jako když krmíte dítě.

- Pokud chcete používat konzervy, je třeba seříznout špičku stříkačky tak, aby byla stejně široká jako hlaveň a umožnila průchod krmiva. Pokud se nechcete zbavit špičky stříkačky, můžete jídlo smíchat s trochou vody a poté sítem odstranit větší než otvor špičky jehly.

KOČIČÍ BIBLE

- Jednou jsem řešil těžký případ kočky jménem Bruno. Byl znepokojivě obézní (21 kg) a ani po dvou týdnech krmení stříkačkou nechtěl dát do tlamy konzervu. Využila jsem návštěvy veterináře a zavedla mu výživovou trubičku, která vedla přímo do žaludku. Po dvou týdnech, kdy jsem ho krmil přes hadičku, začal pomalu přijímat konzervy. Rychle se posunul do dnešního dne, váží 7 kilo, má menší váhu a je velmi hravý.

- Nevzdávejte to! Kočky se mohou úplně štítit konzerv, jako jeden z mých kocourů, který byl prvních dvanáct let svého života zvyklý na suchou stravu, ale jednoho dne jako by se vymkl z komfortní zóny a začal jíst konzervy a je nyní je na plné konzervované stravě. Nakonec to všechno skončí tak, že kočky budou jíst konzervy.

- Výše uvedené jsou jen některé z metod, které můžete vyzkoušet. Nemusí fungovat všechny a různé tipy mohou fungovat na různé kočky, ale musíte být trpěliví a odhodlaní. Mým kočkám trvalo tři měsíce, než přešly na jinou stravu, ale u všech koček by to nemělo trvat tak dlouho.