Skupina MEDICON
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 14000 Praha 4
Radiologie a zobrazovací metody
Kontakt: tel.: e-mail: recepce@medicon-rdg.cz

Radiologie a zobrazovací metody

Příjmení: **Kadlas**	Č.P.: **500526236**	Zdr. pojišťovna: **201**
Jméno: **Martin**	RČ: **500526236**	
Titul: **Ing**		Pohlaví: muž
Trvalé bydliště: **Roháčova 268/24, Praha 3, 13000**		Datum narození: 26.5.1950
Datum vyšetření: 14.11.2024		

Žadatel: 03146001 - MUDr.Irena Zadáková-neurolog, NEUROSALIX spol. s r.o., Z
Diagnóza: M511 - Onemocnění lumbálních a j.meziobratl.plotének s radikulopatií (G55.1*)
Vyšetření: Ls_páteř - Ls páteř **Přístroje:** Magnetom
Materiál:

Nález:

MR vyšetření bederní páteře:

Vyšetření provedeno nativně v sekvencích t2_tse_sag, t1_tse_sag, t2_tse_cor, t2_STIR_sag_p2, t2_spc_sag_p3, t2_tse_tra v segmentech L2/3 - L5/S1.

Indikace: VAS.

Bederní lordoza je narušená 5 mm ventrolistézou obratle L4. Obratl. těla jsou odpovídající výše, při spondyloze přihrocená osteofyty, krycí plotny jsou zvlněné. Meziobratl. prostory jsou difuzně snížené, disky hypohydratované až dessikované, v segmentech L2/3, L3/4 s doprovodným subchondrálním edémem kostní dřeně, v segmentu L4/5 s tukovou přestavbou kostní dřeně. Kostní páteřní kanál je v AP rozměru šíře 14 - 19 mm, konus míšní je v úrovni obratle Th12, je zachovalé signálové intenzity. Paravertebrální svalstvo je symetrické, bez změny signálové intenzity.

Dorsální protruze disku Th12/L1 komprimující durální vak na 11 mm v AP rozměru, zužující lat. recessy. Neuroforamina jsou prostorná.

Asymetrická cirkulární protruze disku L1/2 zužující laterální recessy, komprimující durální vak, který je v AP rozměru zúžen na 8 mm. Neuroforamina jsou prostorná.

Asymetrické cirkulární protruze disků L2/3-L4/5 stenozující spolu se spondylartrotickými změnami lat. recessy, komprimující durální vak, který je v AP rozměru zúžen na 6 mm. Míšní kořeny jsou intradurálně nahloučené, zcela vyplňují durální vak. Na protruzi disku L3/4 navazuje levostranná subartikulární sekvestrující herniace disku, sekvestr o velikosti 6 mm zasahuje foraminálně a komprimuje míšní kořen L3 l.sin. Ostatní neuroforamina jsou hraniční šíře. Ligamenta flava jsou hypertrofická.

Asymetrická cirkulární protruze disku L5/S1 stenozující spolu se spondylartrotickými změnami levostranný lat. recessus, naléhající na durální vak. Neuroforamina jsou hraniční šíře, spondylartrotickými změnami defigurovaná.

Závěr: Spinální stenoza s maximem nálezu v segmentu L2/3 (6x10 mm) dle Schizace gr. C. Povšechná osteochondroza a protruze disků s navazující levostrannou subartikulární sekvestrující herniací disku L3/4 foraminálně komprimující míšní kořen L4 l.sin. End plate disease Modic I L2/3, L3/4, Modic II L4/5.

Vedl. nález: Četnější cysty ledvin.

Provedeno: 21.11.2024 10:20:19 MUDr. Hana Jiřičková